

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST - Arras - Tél. 23.14  
(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Alertes Agricoles d'ARRAS.  
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL  
15 F

Supplément n° 3  
N° XLV - 25 Juin 1964

## AVERTISSEMENTS

### MILDIU DE LA POMME DE TERRE

L'évolution de la maladie a été ralentie par le dernier rafraichissement. Cependant, il faut s'attendre, à la suite des contaminations enregistrées les 14 et 19 juin, à un nouvel accroissement des foyers entre le 27 et le 31 juin.

De nouvelles pluies survenant fin-juin, début-juillet risqueraient donc d'empirer la situation.

De plus, il y a toujours intérêt à placer le traitement le plus possible juste avant la pluie.

En conséquence,

1°/ si le temps est au beau-sec à la réception de l'avis, attendre quelques jours et intervenir du 28 au 30 juin.

2°/ si le temps est incertain, intervenir immédiatement, avant le 28 juin.

3°/ dans les cultures de Bintje déjà envahies par le mildiou, ne prendre aucun risque, intervenir immédiatement et renouveler la protection après la prochaine pluie importante.

4°/ dans les cultures de variétés hâtives qui doivent être récoltées avant le 15 juillet et qui sont actuellement indemnes, on peut raisonnablement prendre le risque de ne plus traiter à condition d'être prêt à détruire rapidement la végétation en cas d'infestation juste avant l'arrachage.

### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

### CULTURES FRUITIÈRES

La protection doit être bien assurée maintenant. Les traitements effectués avant les dernières pluies doivent être renouvelés. Ceux effectués après le 22 juin restent valables.

### TAVELURES

Profiter des interventions dirigées contre le carpocapse pour épandre un produit fongicide car de nouvelles taches sont souvent apparues localement.

### CECIDOMYIE DES FLEURS

### POIS

(valable surtout pour les Flandres et la vallée de la Lys)

Un deuxième vol est observé actuellement. Protéger les variétés tardives (en début de floraison) avec un produit à base de D.D.T., de lindane ou de parathion. En effet, l'emploi de la Dieldrine n'est pas autorisée en culture maraîchère.

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,

R. DIVOUX

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux,

P. COUTURIER